

# 含 Ethinylestradiol 及 Drospirenone 成分之複方口服避孕藥藥品 之「病人用藥安全指引」

在您服用本藥品之前，請仔細閱讀此份用藥安全指引。若對其內容或治療選擇有任何問題，可請教您的醫師或藥師。也請妥善保存這份用藥安全指引，以便在治療期間能夠隨時參考。然而此用藥安全指引無法取代醫師臨床診斷與指導，若發現有疑似症狀時，應立即諮詢您的醫師或藥師。

## 一、藥品中英文商品名：

免爾孕<sup>®</sup>(Yanci-30<sup>®</sup>)。

## 二、「關於免爾孕<sup>®</sup>您必須了解的資訊」：

- A. 本藥品須由醫師處方使用，病人不可沒有處方自行購買。
- B. 本藥品可能會增加罕見但嚴重(可能造成死亡)的血栓風險。
- C. 「若您發現下列狀況時，請立即諮詢您的醫師」：

- 下肢，尤其小腿嚴重疼痛或腫脹，可能伴隨著觸痛、溫熱感、皮膚顏色改變，例如轉白、變紅或藍。
- 突然不明原因的呼吸困難或呼吸急促；深呼吸時劇烈胸痛現象增加；突發性不明原因的咳嗽(可能伴隨血痰)；這表示你可能發生了一種深層靜脈血栓的併發症，叫做肺栓塞，這種情形是因為血栓從腿部流到了肺部。
- 胸痛，通常是急性發作，但有時只是胸部不適，壓迫感，沉重感，上半身不適散布到背部、下頷、咽喉、手臂，連同腫脹感或窒息感、出汗、噁心、嘔吐或眩暈，您很可能是發生了心肌梗塞。
- 臉部，手臂或腿部無力或麻木，尤其是身體的某一側；說話或理解困難；突然的意識紊亂；突然喪失視力或視力模糊；比平常劇烈的頭痛/偏頭痛。您很可能發生了中風。

## 三、「什麼是免爾孕<sup>®</sup>？能夠用來治療什麼？」：

免爾孕<sup>®</sup>(Drospirenone/Ethinylestradiol)為一種合併 progestogen 及 estrogen 的複方產品，作為口服避孕藥使用。

## 四、「不應使用免爾孕<sup>®</sup>的情形」：

- 現有或曾有心肌梗塞、肺栓塞等動靜脈血栓/血栓性栓塞病史(例如：深層靜脈血栓、肺栓塞、心肌梗塞或腦血管意外)。
- 現有或曾有血栓症的前兆(短暫性腦缺血發作，狹心症)。
- 有一項嚴重或多項(如：嚴重高血壓、嚴重脂蛋白異常血)動靜脈血栓風險因子。
- 先天性或後天性靜脈或動脈血栓體質。
- 曾有局部神經症狀之偏頭痛。
- 併有血管問題的糖尿病。
- 現有或曾患肝臟腫瘤(良性或惡性)、嚴重的肝臟疾病且肝功能指數仍未回復正常時。
- 患有或疑似有受性類固醇影響(例：在生殖器官或乳房處)的惡性腫瘤。
- 不明原因的陰道出血。
- 已知或疑似懷孕、哺乳。

- 對本品主成分或任一賦形劑過敏者。
- 嚴重腎功能不足或急性腎衰竭。

五、「下列情形可能增加您的血栓風險，請諮詢您的處方醫師並注意血栓相關症狀」：

- 開始使用免爾孕<sup>®</sup>的第一年(包括停藥一個月以上之後再重新開始服用)。
- 體重過重(身體質量指數BMI 大於 30 kg/m<sup>2</sup>)。
- 超過35歲。
- 曾有近親在相對年輕的時期(50 歲以下)發生過血栓。
- 最近幾週剛生產完。
- 抽菸。
- 最近進行了一個手術。
- 下肢長期靜止不動。
- 長途旅程(例如長程飛機)。
- 高血壓。
- 偏頭痛。
- 瓣膜性心臟病或是心律不整。

六、「如果有下列情況，請記得告知醫師、護理人員您正在服用免爾孕<sup>®</sup>」：

- A. 即將接受手術時或是接受過手術。
- B. 如果您正在服用其他藥物而當醫療專業人士詢問時。

七、病人用藥資訊：

本病人用藥安全指引僅提供最重要之藥品安全訊息，更多詳細內容請參閱盒內藥品說明書(仿單)，或諮詢您的醫師或藥師。

如有任何藥品安全方面的疑慮請諮詢台灣邁蘭有限公司，諮詢專線:02-6603-1688。

如果您懷疑發生了與藥品相關的不良反應，請儘快諮詢醫療專業人員，或通報至全國藥物不良反應通報中心。(電話: 02-2396-0100；傳真: 02-2358-4100；網站:

<https://adr.fda.gov.tw/Manager/WebLogin.aspx> )。